



LOGIGRAMME D'AIDE À LA GESTION
 D'UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

pour **fièvre** chez un enfant
 de **0 à 36 mois**

FIÈVRE

38° C
 en rectale
 OU
> 37,5° C
 en axillaire

IMPORTANCE

Du comportement
Des signes associés
 (céphalées, douleur,
 éruption)

VIGILANCE

Pathologies chroniques
 (déficit immunitaire,
 drépanocytose, maladies
 métaboliques)
Séjours récents dans un pays
à risque endémique
 (paludisme)

1 Quel âge a votre enfant et quelle température a-t-il ?

Âge :	Valeur de la fièvre :	Méthode de mesure :	Durée de l'épisode fébrile :	Moyens mis en œuvre :
				Noms et doses des médicaments si donnés, quand :

Moins de 1 mois et température > 38°

! **OUI** → **Appel au 15*** pour orientation vers les urgences pédiatriques

Entre 1 et 3 mois et température > 38°

OUI → **Prévoir consultation dans les 6 heures**

2 Quel est le comportement de votre enfant ?

Inconscient, difficile à réveiller
 Mou ou ne bouge pas
 Convulse
 Est très gêné pour respirer
 A les lèvres bleues
 A des taches rouges ou violacées sur la peau
 A le teint gris

! **OUI** → **Appel au 15*** pour orientation vers les urgences pédiatriques

3 Existe-t-il un terrain particulier (maladie chronique, déficit immunitaire, drépanocytose, maladies métaboliques) ?

! **OUI** → **Avis du spécialiste référent / À défaut : appel au 15*** pour orientation vers les urgences pédiatriques

4 A-t-il fait un séjour récent dans un pays à risque endémique (paludisme) ?

! **OUI** → **Appel au 15*** pour orientation vers les urgences pédiatriques

5 Eruption cutanée ? (sauf si vésicule avec ressemblance à des cloques)

! **OUI** → **Appel au 15*** pour orientation vers les urgences pédiatriques

6 Votre enfant pleure-t-il de manière inhabituelle ?

Pleure-t-il quand on le touche, on le mobilise ?
 Pleure depuis combien de temps ?

OUI → **Prévoir consultation dans les 6 heures**

7 Votre enfant reste-t-il inconfortable quand la fièvre descend ?

À faire préciser : ...

OUI → Prévoir consultation dans les 24 heures

8 A-t-il du mal à respirer ?

Avec des signes de gêne importants (bruits respiratoires, côtes visibles...)?

OUI → Prévoir consultation dans les 6 heures

La gêne disparaît après un lavage de nez ?

OUI → Prévoir consultation dans les 24 heures

9 Votre enfant :

Refuse-t-il de boire ?
A-t-il du mal en urinant ?
Ses urines sont-elles rouges ?
A-t-il de la diarrhée ou des vomissements ?
A-t-il mal aux oreilles, à la gorge ?

OUI → Prévoir consultation dans les 24 heures

S'il refuse de boire, s'il a des selles liquides ou des vomissements :

A-t-il arrêté d'uriner ?
A-t-il les yeux enfoncés ?
Est-il pâle, a-t-il des vomissements incoercibles ?
A-t-il des diarrhées > 10 ?
A-t-il très soif ?

! OUI → **Appel au 15*** pour orientation vers les urgences pédiatriques

10 Depuis quand a-t-il de la fièvre ?

Depuis plus de 48 heures ?

OUI → Prévoir consultation dans les 24 heures**

11 Êtes-vous inquiets sur l'état de votre enfant ?

À faire préciser : ...***


OUI → Prévoir consultation dans les 6 à 12 heures**

* Selon les conditions de régulation de l'accès aux urgences pédiatriques.

** En l'absence de terrain à risque et de signe de gravité.

*** Comportement inhabituel avec la fièvre (si uniquement inquiétude sur le chiffre de la fièvre, prévoir consultation dans les délais selon les questions ci-dessus).

SYNTHÈSE



 APPEL AU 15 POUR ORIENTATION VERS LES URGENCES	<ul style="list-style-type: none">→ < 1 mois→ Troubles de conscience, hypotonie→ Convulsions→ Retour d'un pays à risque endémique (paludisme)	<ul style="list-style-type: none">→ Troubles de la coloration : cyanose→ Eruption purpurique
CONSULTATION DANS LES 6 HEURES	→ 1- 3 mois	<ul style="list-style-type: none">→ Troubles respiratoires associés→ Modification du comportement, pleurs inhabituels
CONSULTATION DANS LES 24 HEURES	<ul style="list-style-type: none">→ Terrain particulier→ Mauvaise prise de biberon < 50%→ Fièvre isolée Persistante > 48 heures	<ul style="list-style-type: none">→ Troubles digestifs associés→ Hématurie ou dysurie→ Inconfort même en apyrexie
TRAITEMENT AU DOMICILE	→ Absence d'alternation de l'état général	<ul style="list-style-type: none">→ Symptômes mineurs associés à une atteinte gastro intestinale ou nasale→ Parents ayant bien compris les conseils donnés et la surveillance, avec rappel téléphonique si nécessaire→ Parents rassurés par les conseils****

**** Si surveillance au domicile :

- Conseils habituels : **découvrir, hydrater**, température de la pièce entre **18°C et 20°C**
- **Paracétamol** pour soulager l'inconfort
- **Surveillance pendant 48h** au domicile et **consultation médicale au-delà** (ou plus tôt si comportement inhabituel, fièvre mal tolérée, aspect de la peau anormal)

! ATTENTION BAINS ET ENVELOPPEMENTS FRAIS NON RECOMMANDÉS

En complément,
orienter vers le **site parents** :
parents.reseau-naissance.fr